

QUVIVIQ ▽
daridorexant 25mg, 50mg
compresse

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI QUVIVIQ™¹



QUVIVIQ™ deve essere assunto per via orale la sera entro 30 minuti prima di coricarsi¹



La sera deve essere evitato il consumo di pompelmo o succhi di frutta a base di pompelmo¹



L'assunzione di **QUVIVIQ™** subito dopo un pasto abbondante può ridurre l'effetto sull'insorgenza del sonno¹



Nei soggetti sani, l'assunzione concomitante di alcool ha determinato un assorbimento prolungato di **QUVIVIQ™**, mentre l'esposizione a QUVIVIQ™ (C_{max} e AUC) e la $t_{1/2}$ sono rimaste invariate¹



Precauzioni particolari per la conservazione

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione¹



QUVIVIQ™ 25 mg - Compresa rivestita con film - 30 compresse - AIC n. 050050020
Classe di rimborsabilità: C - Prezzo al pubblico: 85,00 €.

QUVIVIQ™ 50 mg - Compresa rivestita con film - 30 compresse - AIC n. 050050044
Classe di rimborsabilità: C - Prezzo al pubblico: 85,00 €.

Regime di fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Bibliografia

1. **QUVIVIQ™**. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

idorsia

QUVIVIQ ▽
daridorexant 25mg, 50mg
compresse

**QUVIVIQ™ è indicato
per il trattamento di pazienti
adulti affetti da insonnia
caratterizzata da sintomi
presenti da almeno tre mesi
e con un considerevole impatto
sulla funzionalità durante il giorno.¹**



Clicca sul qr-code per consultare
il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

▽ Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Pubblicità rivolta ai medici/farmacisti depositata in AIFA il: 09/07/2026.
VIETATA LA DISTRIBUZIONE/ESPOSIZIONE AL PUBBLICO.
Codice di deposito aziendale: IT-DA-00285



POSOLOGIA

La **dose raccomandata** per gli adulti è di una **compressa da 50 mg per notte**, assunta per via orale la sera entro 30 minuti prima di coricarsi.¹

La dose massima giornaliera è 50 mg.¹

Se un paziente dimentica di assumere QUVIVIQ™ prima di coricarsi, la dose saltata **non deve essere assunta durante la notte.**¹

Sulla base della valutazione clinica, alcuni pazienti potrebbero dover assumere una dose di 25 mg per notte:¹

- nei pazienti con **compromissione epatica moderata**, la dose raccomandata è di una compressa da 25 mg per notte;¹
- nei pazienti con **compromissione epatica severa**, QUVIVIQ™ **non è stato studiato e non è raccomandato;**¹
- la dose raccomandata in caso di utilizzo in concomitanza con inibitori moderati del CYP3A4 è di una compressa da 25 mg per notte;¹
- in caso di **co-somministrazione con depressori del SNC**, può essere necessario un aggiustamento della dose di QUVIVIQ™ e/o degli altri medicinali, in base alla valutazione clinica, **a causa dei potenziali effetti additivi.**¹

Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani (>65 anni).¹

Sono disponibili dati limitati in pazienti con età superiore a 75 anni.¹ Non vi sono dati disponibili in pazienti di età superiore a 85 anni.¹



DURATA DEL TRATTAMENTO

Sono disponibili dati clinici **fino a 12 mesi** di trattamento continuativo.¹

L'opportunità di proseguire il trattamento deve essere valutata **entro 3 mesi** dal suo inizio e successivamente con cadenza periodica.¹

La durata del trattamento deve essere la più breve possibile.¹



INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento può essere interrotto **senza una riduzione graduale della dose.**¹



QUVIVIQ™
non ha mostrato
segni indicativi
di un potenziale abuso
o dipendenza fisica¹



**Non ci sono state
evidenze di sintomi
di astinenza¹**



**Non ci sono state
evidenze di insonnia
di rimbalzo¹**